



Avertissements agricoles

BRETAGNE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT
SERVICE RÉGIONAL DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

280, rue de Fougères, 35700 RENNES ☎ 99 36 01 74



Publication périodique

BULLETIN TECHNIQUE DE LA STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

ÉDITION : GRANDES CULTURES

BULLETIN N° 51
(Supplément au n° 142)

6 mai 1987

BLE ET ORGES D'HIVER faites un traitement fongicide !

COLZA D'HIVER - toute dernière limite pour traiter le
sclérotinia dans les parcelles à risques !

- surveillez alternaria et taches blanches !

MAIS desherbage en post-levée !

BLE D'HIVER

Stade : de 7 (2 noeuds apparents) à 8 (dernière feuille visible encore enrourlée). Les cultures les plus précoces arrivent au stade 9.

SITUATION

- **Maladies du pied** : les symptômes de piétin-verse sont rares (moins de 2 % des gaines avec taches). Le rhizoctone est un peu plus fréquent mais reste à un niveau inférieur à celui de l'année passée.

- **Maladies des feuilles** : la septoriose (essentiellement Tritici) est présente sur les feuilles du bas : F4 et F5 (4^{ème} et 5^{ème} feuille à partir du sommet). La faible humidité et les températures basses du moment sont peu favorables à une remontée rapide de cette maladie, d'autant plus que de nouvelles feuilles viennent d'apparaître. Cependant, les taches présentes sont bien fructifiées. On peut donc s'attendre à une montée des symptômes dès que des pluies ou une période plus humide arriveront.

7/12

l'oïdium est fréquent avec parfois de fortes intensités sur les gaines des feuilles inférieures.

les rouilles sont absentes.

PRECONISATIONS

- Situations avec risques de piétin-verse résistant aux fongicides B.M.C.:

Le traitement doit avoir été réalisé avec un produit à base de prochloraz. Si ce n'est pas le cas : voir ci-dessous.

- Situations sans risques de piétin-verse résistant :

Faites un traitement avec un fongicide agissant contre piétin, septorioses, oïdium et rouilles (produit **P O S Rb** dans le dépliant vert ITCF-SPV). Cette intervention devra être effectuée dans le courant de la semaine prochaine dès que la dernière feuille sera bien apparente. Choisissez un produit contenant de la carbendazime ou du thiophanate-méthyl. Un passage plus précoce peut être recommandé dans les cas suivants:

- présence d'oïdium en fortes quantités sur les feuilles.
- utilisation de spécialités à base de carbendazime ou thiophanate-méthyl + fongicide de contact (manèbe ou mancozèbe ou chlorotalonil).

Dans le cas où vous n'envisagez qu'un seul traitement fongicide: préférez PUNCH C ou TILT C OU SP ou IMPACT RM SOPRA ou CORBEL TRIPLE.

ORCES D'HIVER

Stade : apparition des barbes à épiaison.

SITUATION

La rhynchosporiose se trouve dans une majorité de situations sur les feuilles basses. L'intensité est faible en général malgré une progression récente. L'oïdium est également fréquent. Les helminthosporioses et les maladies du pied sont rares. Par contre des pustules de rouille naine ont fait leur apparition depuis une semaine.

PRECONISATIONS

Faites un traitement en tout début épiaison avec un fongicide agissant au minimum contre rhynchosporiose, oïdium, rouille naine (produit **Rh O Rn** du dépliant vert ITCF-SPV). Compte tenu de l'époque, il n'est plus nécessaire de choisir une spécialité contenant de la carbendazime.

Cette unique intervention devrait être suffisante.